

PROTOSCOLOS PREVENTIVOS

LA PREVENCIÓN ES EL PRIMER PASO PARA MAXIMIZAR LA PRODUCCIÓN

Sistemáticamente
en todos los animales

Según incidencia de desórdenes

Vitamina E y Se
Si hay riesgo
retención placentaria

Calcio

1 bolo diario / 2 días

**Precursores
Glucosa**

2-3 días si riesgo cetosis

Antiinflamatorios

Choques Vitamínicos

Si debilidad de la vaca

Protector Hepático


Si hay signos de
alteraciones metabólicas

PARTO →

PROGRAMAS PREVENTIVOS

LA PREVENCIÓN ES EL PRIMER PASO PARA MINIMIZAR LA PATOLOGÍA Y MAXIMIZAR LA PRODUCCIÓN

UNA CORRECTA HIGIENE, BIENESTAR Y MANTENIMIENTO DE PEZUÑAS ES FUNDAMENTAL PARA LA PREVENCIÓN DE PATOLOGÍA



	Hipocalcemia clínica/subclínica	Retención Placenta	Metritis	Cetosis clínica/subclínica	Mamitis	Desplazamiento / Torsión Cuajar	Cojeras
Indicadores de riesgo / sistematizar tratamiento	Incidencia clínica >3% No alimentación específica de periparto Concentración partos estacional	Incidencia clínica >10% No disponibilidad patio/alimentación específica preparto Concentración partos estacional		Incidencia clínica >2% Incidenca subclínica >9% CC elevada al parto		Incidenca clínica >3% No alimentación preparto Incidenca elevada de otras patologías Dietas bajas de fibra	Incidenca clínica >5%
Medidas preventivas	Alimentación específica pre/postparto Administración Calcio	Alimentación específica preparto Vitamina E y Se preparto			CMT 7 días postparto	Racion equilibrada Adaptación alimentación preparto Calcio	
Productos adecuados: dosis							